

PENICILLINE ALLERGIE

Penicillines zijn vaak eerste keuze wat het belang van een correct allergie label onderstreept.

Allergie labels zijn vaak onterecht:

- meestal bijwerking (geen allergische reactie)
- incidentie van een anafylactische reactie na toediening van penicilline: uiterst zeldzaam (anafylaxie < 0.015%)
- IgE antistoffen (anafylaxie): verdwijnen na verloop van tijd

Bovendien zijn de gebruikte alternatieven vaak ondergeschikt (minder actief, meer toxische nevenwerkingen,...).

Vragenlijst in HIX (of abnol) is een handige tool om correct te (de)labelen!

HIX:


Vragenlijst achter icoon

Welke antibiotica zijn een optie bij penicilline allergie?

• Beta-lactam antibiotica

Bij het toedienen van penicilline kunnen naast bijwerkingen verschillende allergische reacties optreden.

Overzicht van beta-lactam antibiotica die al dan niet veilig kunnen toegediend worden:

		IgE gemedieerde allergie (type 1) < 6 uur na inname		Uitgestelde allergie (type 4) > 6 uur na inname	
		Matige allergie : verheven, rode, jeukende plekjes (urticaria) < 24u ter plekke 	ERNSTIGE allergie : angio-oedeem, kortademigheid, piepen, bewustzijnsverlies... 	Matige allergie : maculopapulaire eruptie 	Ernstige allergie : blaren of zweren (lippen, vagina...); loslaten van huid 
PENICILLINES	penicilline	contra-indicatie			
	amoxicilline				
	flucloxacilline				
	piperacilline				
	temociline				
CEFALOSPORINES	cefadroxil				
	cefazoline	veilig	*		
	cefuroxime		*		
	cefotaxime		*		
	ceftriaxone		*		
	ceftazidime		*		
	cefepime		*		
	cefiderocol		*		
	ceftolozane		*		
	ceftaroline		*		
C	meropenem				*
M	aztreonam				*

C: carbapenems; M: monobactams

(*): Toegenomen waakzaamheid is aangewezen gedurende min. 1 uur na eerste toediening!

- **Non-beta-lactam antibiotica** zoals clindamycine, vancomycine, levofloxacin, ciprofloxacin, moxifloxacin, cotrimoxazole,... zijn uiteraard ook opties bij penicilline allergie.