


Geachte collega,

Zoals u weet en blijkt uit onderstaande grafiek van Sciensano doet influenza momenteel volop de ronde.

Uit grondige literatuurstudie blijkt dat de evidentie voor het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) bij influenza momenteel vrij zwak is.

Binnen de antibioticabeleidsgroep werd er dan ook beslist om het advies met betrekking het voorschrijven van oseltamivir (Tamiflu®) terug te schroeven.



Het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) is geïndiceerd indien de patiënt voldoet aan volgende criteria:

1. BEWEZEN INFLUENZA met noodzaak tot HOSPITALISATIE

EN

of **ZWANGER**

of **IMMUUNGECompromitteerd**

of **KRITIEK ZIEK (OPNAME IZ)**

EN

<48H na ontstaan van symptomen

(cavé meerwaarde van opstart Tamiflu® onduidelijk indien het interval tot opstart meer dan 48 uur bedraagt)

EN

In functie van **ERNST** ziektebeeld

2. BEWEZEN INFLUENZA met noodzaak tot HOSPITALISATIE op INTENSIEVE zorgen

Hoe behandelen indien er gekozen wordt voor opstart?

Onmiddellijk opstarten met 75mg Tamiflu® po 2-maal/dag voor volwassenen en kinderen > 40 kg

* Dosis Tamiflu aanpassen bij nierinsufficiëntie obv eGFR:

eGFR tussen 30 en 60ml/min : 2x 30 mg/d per os

eGFR tussen 15 en 30ml/min: 1x 30 mg/d per os

eGFR < 15 ml/min: NIET gebruiken

hemodialyse: 1x 30 mg/d per os na elke dialysesessie

** Dosis bij kinderen:

0 tot 1 jr en <15 kg: 2x 3 mg/kg/d per os

>=1 jr en 10-15 kg: 2x 30 mg/d per os

15-24 kg: 2x 45 mg/d per os

24-40 kg: 2x 60 mg/d per os

Normale duur van therapie is 5 dagen maar kan langer zijn (duur van de symptomen) bij immuungecompromitteerde patiënten.

Graag verder ook uw maximale aandacht voor **infectiepreventiemaatregelen (waaronder HOEST- en HANDHYGIENE)** om de overdracht van het virus binnen ons ziekenhuis te voorkomen.

Bij vragen of bemerkingen kan er steeds contact opgenomen worden met dr. E. Oris (4714), dr. S. Ressler (4717), dr. N. Czech (4513).