


Geachte collega,

Zoals u weet en blijkt uit onderstaande grafiek van Sciensano doet influenza momenteel volop de ronde.

Uit grondige literatuurstudie blijkt dat de evidentie voor het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) bij influenza momenteel vrij zwak is. Binnen de antibioticabeleidsgroep werd er dan ook beslist om het advies met betrekking het voorschrijven van oseltamivir (Tamiflu®) terug te schroeven.



Het gebruik van oseltamivir (Tamiflu®) is geïndiceerd indien de patiënt voldoet aan volgende criteria:

BEWEZEN INFLUENZA met noodzaak tot **hospitalisatie**

EN

of **ZWANGER**

of **IMMUUNGECompromitteerd**

of **KRITIEK ZIEK (OPNAME IZ)**

EN

<48H na ontstaan van symptomen

(cavé meerwaarde van opstart Tamiflu® onduidelijk indien het interval tot opstart meer dan 48 uur bedraagt)

EN

In functie van **ERNST** ziektebeeld

Hoe behandelen indien er gekozen wordt voor opstart?

Onmiddellijk opstarten met 75mg Tamiflu® po 2-maal/dag voor volwassenen en kinderen > 40 kg

* Dosis Tamiflu aanpassen bij nierinsufficiëntie obv eGFR:

eGFR tussen 30 en 60ml/min :	2x 30 mg/d per os
eGFR tussen 15 en 30ml/min:	1x 30 mg/d per os
eGFR < 15 ml/min:	NIET gebruiken
hemodialyse:	1x 30 mg/d per os na elke dialysesessie

** Dosis bij kinderen:

0 tot 1 jr en <15 kg:	2x 3 mg/kg/d per os
>=1 jr en 10-15 kg:	2x 30 mg/d per os
15-24 kg:	2x 45 mg/d per os
24-40 kg:	2x 60 mg/d per os

Normale duur van therapie is 5 dagen maar kan langer zijn (duur van de symptomen) bij immuungecompromitteerde patiënten.

Graag verder ook uw maximale aandacht voor **infectiepreventiemaatregelen (waaronder HOEST- en HANDHYGIENE)** om de overdracht van het virus binnen ons ziekenhuis te voorkomen.